

Tutorium Mathe 2 MT

Aufgabenblatt: Differentialrechnung (+Lösungen)

- 1) Berechnen Sie die Koordinaten des Schnittpunktes S der Tangentialebenen an den Graphen der Funktion

$$f(x, y) = 4x^2 + 8y^2 + xy$$

in den Punkten $P_1(0, 1, 8)$ bzw. $P_2\left(0, -\frac{1}{2}, 2\right)$ und der x-z-Ebene.

Lösung:

Berechnung der partiellen Ableitungen von $f(x, y)$:

$$f_x(x, y) = 8x + y$$

$$f_y(x, y) = 16y + x$$

Tangentialebenen:

$$P_1 \rightarrow z = x + 16 \cdot (y - 1) + 8 = x + 16 - 8$$

$$P_2 \rightarrow z = -\frac{1}{2}x + (-8) \cdot \left(y + \frac{1}{2}\right) + 2 = -\frac{x}{2} - 8y - 2$$

Für die x-z-Ebene gilt $y = 0$. Berechnung des Schnittpunktes per LGS.

$$\begin{array}{l} z - x = -8 \\ \frac{x}{2} + z = -2 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} -x + z = -8 \\ x + 2z = -4 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 4 + 2z + z = -8 \\ x = -4 - 2z \end{array} \Leftrightarrow 3z = -12$$

$$z = -4$$

$$x = -4 + 8 = 4$$

Koordinaten des Schnittpunktes:

$$S(4, 0, -4)$$

2) In welchen Punkten ist die Tangentialebene an den Graphen der Funktion

$$f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$$

parallel zur Ebene $2x + 2y + z = 0$? Stellen Sie für jeden der ermittelten Punkte die Gleichung der Tangentialebene auf.

Bestimmen der Tangentialebene von $f(x, y)$:

$$f_x(x, y) = -2x$$

$$f_y(x, y) = -2y$$

$$\Rightarrow z = -2x \cdot (x - x_0) - 2y \cdot (y - y_0) + f(x_0, y_0)$$

Bestimmung der Normalenvektoren der beiden Ebenen:

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Bei zwei parallelen Ebenen sind die Normalenvektoren linear abhängig, es muss also gelten $\vec{n}_1 = \lambda \cdot \vec{n}_2$. Dies wird per LGS eingesetzt.

$$2x = \lambda \cdot 2$$

$$2y = \lambda \cdot 2$$

$$1 = \lambda$$

$$\Rightarrow x = 1, y = 1, z = 4 - 1^2 - 1^2 = 2$$

$$\Rightarrow P_1(1, 1, 2)$$

Tangentialebene für P_1 :

$$z = -2 \cdot (x - 1) - 2 \cdot (y - 1) + f(1, 1)$$

$$z = -2x + 2 - 2y + 2 + 2$$

$$2x + 2y + z = 6$$

3) Sei ε die Tangentialebene an den Graphen der Funktion

$$f(x, y) = x^3 y^2$$

im Punkt $P(1, 2, 4)$. Berechnen Sie den Schnittpunkt von ε mit der z-Achse.

Berechnung der partiellen Ableitungen von $f(x, y)$:

$$f_x(x, y) = 3x^2 y^2$$

$$f_y(x, y) = 2x^3 y$$

Gleichung der Tangentialebene in Punkt P :

$$z = 12 \cdot (x - 1) + 4 \cdot (y - 2) + 4$$

$$= 12x - 12 + 4y - 8 + 4$$

$$z = 12x + 4y - 16$$

Für die z-Achse gilt $x = y = 0$. Durch einsetzen erhält man:

$$z = -16$$

$$\Rightarrow S(0, 0, -16)$$

4) In welchen Punkten ist die Tangentialebene an den Graphen der Funktion

$$f(x, y) = \sqrt{36 - x^2 - 4y^2}$$

Parallel zur Ebene $z = x + y$? Stellen Sie für jeden ermittelten Punkt die Gleichung der Tangentialebene auf.

Bestimmen der Tangentialebene von $f(x, y)$:

$$f_x = -\frac{x}{\sqrt{36 - x^2 - 4y^2}}$$

$$f_y = -\frac{4y}{\sqrt{36 - x^2 - 4y^2}}$$

$$\Rightarrow z = -\frac{x}{\sqrt{36 - x^2 - 4y^2}} \cdot (x - x_0) - \frac{4y}{\sqrt{36 - x^2 - 4y^2}} \cdot (y - y_0) + f(x_0, y_0)$$

Bestimmen der Normalenvektoren:

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{36-x^2-4y^2}} \\ \frac{4y}{\sqrt{36-x^2-4y^2}} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Bei zwei parallelen Ebenen sind die Normalenvektoren linear abhängig, es muss also gelten $\vec{n}_1 = \lambda \cdot \vec{n}_2$. Dies wird per LGS eingesetzt.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x}{\sqrt{36-x^2-4y^2}} = \lambda \\ \frac{4y}{\sqrt{36-x^2-4y^2}} = \lambda \\ 1 = -\lambda \end{array} \right\} \begin{array}{l} \frac{x}{\sqrt{36-x^2-4y^2}} = -1 \\ \frac{4y}{\sqrt{36-x^2-4y^2}} = -1 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} x^2 = 36 - x^2 - 4y^2 \\ 16y^2 = 36 - x^2 - 4y^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2x^2 = 36 - 4y^2 \\ 20y^2 = 36 - x^2 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 2x^2 = 36 - 4 \cdot \left(\frac{36-x^2}{20} \right) \\ y^2 = \frac{36-x^2}{20} \end{array} \Leftrightarrow 2x^2 = \frac{144+x^2}{5}$$

$$\Leftrightarrow 10x^2 = 144 + x^2 \Leftrightarrow 9x^2 = 144 \Leftrightarrow x^2 = 16 \Leftrightarrow x_{1,2} = \pm 4$$

Aus der Gleichung für y^2 geht hervor, dass das Vorzeichen vor den Werten für $x_{1,2}$ durch das Quadrieren wegfällt. Aus den vorherigen Gleichungen kann man allerdings entnehmen, dass die Ergebnisse für x und y negativ sein müssen, weil auch die andere Seite der Gleichung negativ ist. Durch Einsetzen erhält man:

$$y^2 = \frac{36-16}{20} = 1 \Rightarrow y = \pm 1 \rightarrow y = -1$$

Der Wert für z ergibt sich aus der Funktionsgleichung. Daraus erhält man:

$$z = \sqrt{36-16-4} = \sqrt{16} = 4$$

$$\rightarrow P_1(-4, -1, 4)$$

Die Tangentialebene für den ermittelten Punkt P_1 kann nun ermittelt werden:

$$z = -\frac{-4}{4} \cdot (x+4) - \frac{-4}{4} \cdot (y+1) + 1$$

$$z = x + 4 + y + 4 + 1$$

$$z = x + y + 9$$