

Tutorium Mathe 2 MT

Aufgabenblatt: Differentialrechnung Teil 2 (+Lösungen)

- 1) Bestimmen Sie drei positive Zahlen x, y, z , deren Summe gleich 12 und deren Produkt maximal ist.

Vorgabe: $x + y + z = 12$

Zielfunktion: $f(x, y) = x \cdot y \cdot (12 - x - y) = 12xy - x^2y - xy^2 \rightarrow \max.$

$$f_x(x, y) = -y^2 - 2xy + 12y$$

$$f_y(x, y) = -x^2 - 2xy + 12x$$

Bestimmen von kritischen Stellen:

$$\begin{aligned} y^2 + 2xy - 12y = 0 &\Leftrightarrow 2xy = -y^2 + 12y &\Leftrightarrow 2x = -y + 12 &\Leftrightarrow x = \frac{-y}{2} + 6 \\ x^2 + 2xy - 12x = 0 &\Leftrightarrow 2xy = -x^2 + 12x &\Leftrightarrow 2y = -x + 12 &\Leftrightarrow \frac{4y}{2} = \frac{y}{2} + 6 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3y}{2} = 6 \Leftrightarrow y = 4$$

$$\Rightarrow x = -2 + 6 = 4$$

Ein kritischer Punkt liegt bei $(4, 4)$. Nun können die weiteren Berechnungen für mögliche Extremstellen durchgeführt werden.

$$f_{xx}(x, y) = -2y$$

$$f_{xy}(x, y) = -2y - 2x + 12$$

$$f_{yy}(x, y) = -2x$$

$$H f(x, y) = \begin{pmatrix} -2y & -2y - 2x + 12 \\ -2y - 2x + 12 & -2x \end{pmatrix}$$

$$\det(H f(x, y)) = 4xy - (-2y - 2x + 12)^2$$

$$\det(H f(4, 4)) = 64 - 16 = 48 > 0 \rightarrow \text{Extremstelle}$$

$$f_{xx}(4, 4) = -8 < 0 \rightarrow \text{Maximum}$$

Die drei gesuchten Zahlen sind $x = 4$, $y = 4$ und $z = 4$.

2) Ermitteln Sie alle lokalen Maxima und Minima der reellen Funktion

$$f(x, y) = 3xy^2 + 4x^3 - 3y^2 - 12x^2 + 1.$$

$$f_x(x, y) = 3y^2 + 12x^2 - 24x$$

$$f_y(x, y) = 6xy - 6y$$

Aus den Ableitungen ergibt sich bereits die erste kritische Stelle bei $(0, 0)$. Die restlichen müssen per LGS ermittelt werden.

$$\begin{aligned} 3y^2 + 12x^2 - 24x = 0 &\Leftrightarrow 3y^2 = -12x^2 + 24x &\Leftrightarrow 3y^2 = 12 &\Leftrightarrow y = \pm 2 \\ 6xy - 6y = 0 && 6x - 6 = 0 && x = 1 && x = 1 \end{aligned}$$

Durch das Setzen von $y = 0$ erhält man außerdem:

$$12x^2 - 24x = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x \cdot (x - 2) \Rightarrow x = 2$$

Es müssen also insgesamt vier kritische Stellen untersucht werden.

$$f_{xx}(x, y) = 24x - 24$$

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = 6y$$

$$f_{yy}(x, y) = 6x - 6$$

$$H f(x, y) = \begin{pmatrix} 24x - 24 & 6y \\ 6y & 6x - 6 \end{pmatrix}$$

$$\det(H f(x, y)) = (24x - 24) \cdot (6x - 6) - 36y^2 = 144x^2 - 288x + 144 - 36y^2$$

$$\det(H f(1, 2)) = 144 - 288 + 144 - 144 = -144 < 0 \rightarrow \text{keine Extremstelle}$$

$$\det(H f(1, -2)) = 144 - 288 + 144 - 144 = -144 < 0 \rightarrow \text{keine Extremstelle}$$

$$\det(H f(0, 0)) = 144 > 0 \rightarrow \text{Extremstelle}$$

$$\det(H f(2, 0)) = (48 - 24) \cdot (12 - 6) = 144 > 0 \rightarrow \text{Extremstelle}$$

$$f_{xx}(0, 0) = -24 < 0 \rightarrow \text{Maximum}$$

$$f_{xx}(2, 0) = 24 > 0 \rightarrow \text{Minimum}$$

Die Funktion hat bei $(0, 0)$ ein lokales Maximum und bei $(2, 0)$ ein lokales Minimum.

- 3) Bestimmen Sie alle relativen Extrema der Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = x^2 + y \cdot e^y$$

und geben Sie jeweils an, um welche Art von Extremum (Maximum oder Minimum) es sich handelt.

$$f_x(x, y) = 2x$$

$$f_y(x, y) = e^y(1 + y)$$

$$2x = 0 \rightarrow x = 0$$

$$1 + y = 0 \rightarrow y = -1$$

Man erhält eine kritische Stelle bei $(0, -1)$.

$$f_{xx}(x, y) = 2$$

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = 0$$

$$f_{yy}(x, y) = e^y + (1 + y)e^y = e^y(2 + y)$$

$$H f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & e^y(2 + y) \end{pmatrix}$$

$$\det(H f(x, y)) = 2e^y(2 + y)$$

$$\det(H f(0, -1)) = 2e^{-1} > 0 \rightarrow \text{Extremstelle}$$

$$f_{xx}(0, -1) = 2 > 0 \rightarrow \text{Minimum}$$

Die Funktion hat bei $(0, -1)$ ein lokales Minimum.

- 4) Ermitteln Sie alle lokalen Maxima und Minima der reellen Funktion

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + 2y^2 - 3x - 2y.$$

$$f_x(x, y) = 2x + 3y - 3$$

$$f_y(x, y) = 3x + 4y - 2$$

$$2x + 3y = 3$$

$$3x + 4y = 2$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{6}{-1} = -6 \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{-5}{-1} = 5$$

$$f_{xx}(x, y) = 2$$

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = 3$$

$$f_{yy}(x, y) = 4$$

$$H f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det(H f(x, y)) = -1 \Rightarrow \text{keine Extremstelle}$$

In diesem Fall ist es egal, welchen kritischen Punkt man in die Determinante der Hessematrix einsetzt, diese bleibt immer negativ. Die Funktion besitzt daher keine Extremstellen.