

## Probeklausur für Mathe 2 (Medientechnik, SS 2010)

### Hinweise zur Bearbeitung

Als Lösung gelten grundsätzlich der Lösungsweg inklusive aller wichtigen Zwischenschritte und das Endergebnis.

### **WICHTIG!!**

**Auch ein falsches Endergebnis kann bei kleinen Fehlern in der Rechnung zu voller Punktzahl führen. Dazu muss allerdings der Rechenweg zum Ergebnis korrekt sein!**

### Hilfsmittel

Als Hilfsmittel kann eine selbst geschriebene Formelsammlung auf einer DIN-A4 Seite (beidseitig beschrieben oder 2 einseitig beschriebene Seiten) verwendet werden. Elektronische Hilfsmittel sind verboten.

### Bearbeitungszeit

Pro Aufgabe sind durchschnittlich 15 Minuten Bearbeitungszeit vorgesehen.

**Aufgabe 1: Anwendung der Integralrechnung**

Berechnen Sie die Länge des Graphen der Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \ln(\sqrt{x})$  im Intervall  $[1, e^2]$ .

---

**Aufgabe 2: Uneigentliche Integrale**

Berechnen Sie das uneigentliche Integral  $\int_0^{\infty} x \cdot e^{-x^2} dx$ .

---

**Aufgabe 3: Fourier-Reihen**

Die Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sei auf dem Intervall  $[0, 2\pi]$  definiert als  $f(x) = x(2\pi - x)$  und  $2\pi$ -periodisch auf ganz  $\mathbb{R}$  fortgesetzt (Skizze!). Berechnen Sie die Fourier-Reihe von  $f$ .

---

**Aufgabe 4: Fourier-Transformationen**

Berechnen Sie die Fourier Transformierte der Funktion

$$x(t) = \begin{cases} e^{-\frac{t}{2}}, & \text{für } t \geq 0 \\ e^{\frac{t}{2}}, & \text{für } t \leq 0 \end{cases}$$

---

**Aufgabe 5: Lineare Algebra**

Eine Ebene  $E$  geht durch den Punkt  $P(6, 8, 2)$  und hat  $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$  als einen Normalenvektor.

Bestimmen Sie für  $E$  eine Ebenengleichung in Parameterform, Koordinatenform, Normalenform und Hesse'scher Normalenform. Welchen Abstand  $d$  hat der Punkt  $Q(6, 3, 6)$  von der Ebene  $E$ ?

---

**Aufgabe 6: Differentialrechnung**

Berechnen Sie den Schnittpunkt der Tangentialebenen an den Graphen der Funktion

$$f(x, y) = \frac{8x^2 + y^2 - 4}{4}$$

in den Punkten  $P_1(1, 1, 0)$  und  $P_2\left(0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$  mit der x-z-Ebene.

---

**Aufgabe 7: Differentialrechnung**

Berechnen Sie alle relativen Extrema der Funktion

$$f(x, y) = (x^2 + y^2) \cdot e^{-x}$$

und geben Sie jeweils an, um welche Art von Extremum es sich handelt.

---

**Aufgabe 8: Integralrechnung**

Berechnen Sie das folgende Integral

$$\iint_D (2xy - x^2 - y^2) dx dy$$

Dabei sei D jener Bereich, der von den Kurven  $y = 1 - x$ ,  $y = 0$  und  $x = 3$  eingeschlossen wird.

---

**Aufgabe 9: Integralrechnung**

Welches Volumen hat ein Körper, der durch Rotation der Kurve  $f(x) = 1 + \sin(x)$  im Bereich  $0 \leq x \leq 2\pi$  entsteht. Bestimmen Sie außerdem die Masse des Körpers, wenn die Dichte seines Materials  $\rho = \frac{1}{\pi^3}$  beträgt.

(Hinweis: Transformation auf Zylinderkoordinaten)

---

**Aufgabe 10: Differentialgleichungen 1. Ordnung**

Lösen Sie das Anfangswertproblem

$$y' + 2y = e^{2x} + x, \quad y(0) = 2$$

---

**Aufgabe 11: Differentialgleichungen 2. Ordnung**

Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$y'' - y' - 6y = 12 \cos(3x).$$

---

**Aufgabe 12: Matrizen und lineare Abbildungen**

- a) Prüfen Sie, ob die folgende Matrix  $A$  invertierbar ist und berechnen Sie gegebenenfalls die Inverse  $A^{-1}$ .

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- b) Die Matrix  $A$  bilde mit dem Vektor  $\vec{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$  das LGS  $A \cdot \vec{x} = \vec{y}$ . Prüfen Sie dieses auf Lösbarkeit und bestimmen Sie ggf. die Lösung.
-